

1914c XII. Fam. Formicidae. In: A. von Schulthess. Hymenopteren
aus Kamerun gesammelt von Herrn von Rothkirch,
Oberleutnant der Schutztruppe. Deutsche entomologische
Zeitschrift, 1914:288.

XII. Fam. *Formicidae*.

Bearbeitet von Dr. Santschi, Kairouan.

Subfam. *Ponerinae*.

38. *Psalidomyrmex Reichenspergeri* Sant. Soppo, 1 ♂.

♂. Long.: 11 à 11,5 mm. Noir. Diffère de *foveolatus* Em. par la direction longitudinale des rides de la face déclive de l'épinothum; le pédicule est finement réticulé et luisant, lisse derrière. Les stries des côtés du thorax sont effacées par places qui demeurent lisses et luisantes. Aile brun foncé.

Capturé sans ♀ c'est avec quelque réserve que j'attribue ce ♂ à B. Reichenspergeri, dont il a la couleur et la sculpture plus lisse.

39. *Odontomachus assiniensis* Em. Soppo, 6 ♂.

Subfam. *Myrmicinae*.

40. *Sima (Pachysima) latifrons* Em. ♀ ♂. Tiko bei Victoria.

♂ (non encore décrit). Long.: 12 mm. Noir, articulations du scape et des pattes, tarsi, côtés du gaster et base de l'armure génitale roux brunâtre. Luisant, très finement ponctué, surtout sur le dos du thorax. Pubescence fine, assez abondante, grisâtre. Tête aussi longue que large, rétrécie en avant des yeux qui occupent un peu plus du tiers médian des côtés. Le bord postérieur droit est un peu plus étroit que chez *aethiops* Sm. dont il diffère en outre par le 2^{ème} article de l'antenne plus court que large (plus long chez *aethiops*). Thorax plus svelte et plus court. Premier article du pédicule un peu plus bas et un peu plus fortement bordé dessus, du reste très voisin d'*aethiops*.

♀ (non décrite) longue de 7,5 mill. a les mêmes caractères différentiels de *S. aethiops* que la ♀ Congo français, Lobaye (Ringebach 1913). 2 ♀.

41. *Cremastogaster striatula* Em. Duala, 1 ♀.

Subfam. *Camponotinae*.

42. *Camponotus (Myrmogigas) Pompeius* For. Duala, 1 ♀ major.

43. *Camponotus (Myrmoturba) maculatus* Fab. Duala, 1 ♀ minor.

XIII. Fam. *Vespidae*.

Subfam. *Vespinae*.

I. *Belonogaster* Saussure.

44. *B. juvencus* F. R. du Buysson Ann. Soc. ent. France LXXVIII, 1909 p. 220. Duala, VI. 12.

Verbreitet durch Afrika, besonders West-Afrika.

45. *B. griseus* F. R. du Buysson l. c. p. 247.

Duala, VII. 12; Soppo, 730 m, XI. 12.

46. *B. Rothkirchii* nov. spec. 1914 Soc. entomol. XXIX St. 4.